

®
ULTIMAR FORTE COMPRIMÉS
(Artéméther 80mg + Luméfantrine 480 mg Comprimés)

COMPOSITION:

Chaque comprimé contient:

Artéméther ...80 mg

Luméfantrine ...480 mg

Excipients ...q.s.

INDICATIONS:

®

ULTIMAR FORTE comprimés est indiqué pour le traitement de la malaria causée par les souches mélangées, simple ou multi résistantes de P.Falciparum.

POSOLOGIE ET L' ADMINISTRATION:

Poids Corporel/kg	Jour 1		Jour 2		Jour 3	
	0 Heurs	8 Heures	24 Heures	36 Heures	48 Heures	60 Heures
Les adultes et les enfants 35 kg et plus, ou plus de 12 ans	1comprimé	1comprimé	1comprimé	1comprimé	1comprimé	1comprimé

®

ULTIMAR FORTE comprimés doivent être pris avec des aliments ou des boissons riches en matières grasses comme le lait, car elles améliorent l' absorption des médicaments. Répétez la dose si les vomissements se produit dans les 1 heure d' administration. Manger des aliments devrait être encouragée chez les patients car cela améliore l' absorption des Ultimar Forte.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES:

PHARMACOCINETIQUE: Artéméther administré par voie orale est rapidement absorbé, et les niveaux thérapeutiques dans les 60-90 minutes. Pic de concentration plasmatique est atteint en 2 heures environ après l' administration. L' artéméther est rapidement et largement métabolisé dans le foie vers les dihydroartémisinine biologiquement actives métabolite principal. Artéméther et dihydroartémisinine sont liés aux protéins plasmatiques humaines et cette liaison est linéaire. L' élimination de l' artéméther et la dihydroartémisinine à partir de plasma est rapide avec une demi-vie d' élimination d' environ 2 heures.

Luméfantrine (un composé très lipophile) l' absorption commence après un décalage d' environ 2 heures avec une concentration plasmatique maximale en environ 6 à 8 heures après l' administration. Luméfantrine est éliminée très lentement avec une demi-vie de 2 à 3 jours dans individuals sains et 4 à 6 jours chez des patients atteints de paludisme à P. falciparum. Alimentaire favorise l' absorption des deux artéméther-luméfantrine et par conséquent les patients sont encouragés à prendre le médicament avec des aliments gras, si possible.

PHARMACODYNAMIQUE: ULTIMAR FORTE comprimés agissent comme schizontocides sang et est associé à plus d' apurement des gamétocytes rapide. Son site d' effet antiparasitaire est la vacuole alimentaire du parasite du paludisme où l' on pense d' interférer avec la conversion de l' hème, un intermédiaire toxiques produites au cours ventilation d' hémoglobine à la non-toxique haemozin pigment de la malaria.

Luméfantrine est pensé pour interférer avec le processus de polymérisation, tandis que l' artéméther génère des métabolites réactifs à la suite de l' interaction entre son pont peroxyde et le

fer héminique. Ultimar Forte a une action secondaire impliquant l' inhibition de la synthèse des acides nucléiques et des protéines dans le parasite du paludisme. Statistiques des in-vitro et in vivo, des études montrent que Ultimar Forte n' a pas induit de résistance.

CONTRE-INDICATIONS:

Ultimar Forte est contre-indiquée:

- Hypersensibilité à l' artéméthér, luméfantine ou à l' un des excipients du ultimar forte.
- Les patients atteints de paludisme grave selon l'OMS définition
- Premier trimestre de grossesse dans des situations où d' autres anti-paludéens sont available. Il devrait toutefois pas être retenue dans la vie en danger les situations où aucune autre anti-paludiques efficaces sont available. During les deuxième et troisième trimestres, le traitement ne doit être envisagée si les bénéfices escomptés pour la mère l' emporte sur le risque pour le foetus. L' allaitement maternel des femmes ne doivent pas prendre Ultimar Forte. Due à la longue demi-vie de la luméfantine (4 à 6 jours), il est recommandé que l' allaitement au sein ne devraient pas reprendre avant 28 jours sauf si les avantages potentiels pour la mère et l' enfant l' emportent sur les risques du traitement ultimar forte.
- Les patients ayant connu des perturbations de l' équilibre électrolytique par exemple, une hypokaliémie ou une hypomagnésémie
- Les patients prenant un médicament qui est métabolisé par le CYP2D6 du cytochrome comme la flécaïnide, métoprolol, imipramine, l' amitriptyline, la clomipramine
- Les patients qui prennent des médicaments qui sont connus pour allonger l' intervalle QTC tels que: antiarythmiques de classe 1A et 111, neuroleptiques et antidépresseurs, certains antibiotiques, les macrolides, les fluoroquinolones, imidazole, triazole agents antifongiques, cisapride et certaines organisations non sédatifs antihistaminiques (terfénadine, astémizole)

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

Ultimar Forte interactions avec d' autres médicaments est minime compte tenu de sa courte durée de l' administration et de l' index thérapeutique large. Aucune drogue nuisible particulier sur les interactions médicamenteuses a été noticed. Patients devraient être encouragés à manger au dosage times. Since jus de pamplemousse inhibe le métabolisme de certains antipaludéens, il est conseillé de ne pas prendre tout en prenant ultimar forte.

EFFETS SECONDAIRES/EFFETS INDÉSIRABLES:

Ultimar Forte est bien toléré par les nourrissons, les enfants et adults. Most des événements rapportés ont été d' intensité légère à modérée et de la durée et lié au paludisme sousjacentes susceptibles ou à une réponse satisfaisante au traitement plutôt que des effets secondaires Ultimar Forte. Common qui se produisent mai les suivants troubles du sommeil sensations vertigineuses, anorexie, céphalées, palpitations, vomissements, douleurs abdominals, nausées, arthralgie, myalgie, asthénie, fatigue.

PRÉCAUTIONS MISES EN GARDE:

Ultimar Forte n' est pas recommandé pour prophylaxis. Patients qui restent opposés à l' alimentation au cours du traitement doit être étroitement surveillée car le risque de recrudescence mai être greater. Driving et l' utilisation des machines n' est pas recommandée en raison du risque d' étourdissements et fatigue.

STOCKAGE:

Entreposer dans un endroit frais et sec 30°C. Ultimar Forte ci-dessous ne doit pas être utilisé après la date apposée sur la "EXP" pack. Keep hors de la portée et de vue des enfants.